

Linovera®

Mantenimiento de la
integridad de la piel

20 años de experiencia
clínica nos avalan



Ácidos grasos esenciales y
extractos vegetales

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



BBM-LIN-C25V01

Indicaciones



Solución

- Prevención de lesiones por presión.
- Coadyuvante en el tratamiento de las LPP de categoría I.
- En pacientes **cuya integridad de la piel está en riesgo**.

(no utilizar directamente en heridas expuestas)




Emulsión

- Prevención de lesiones por presión, úlceras vasculares y úlceras del pie diabético.
- Coadyuvante en el tratamiento de las LPP de categoría I.
- En pacientes **cuya integridad de la piel está en riesgo**.

(no utilizar directamente en heridas expuestas)

La gama Linovera®:



Procedente de aceite de girasol naturalmente rico en **ácido linoleico**^{1,2}, ácido graso esencial clave en el mantenimiento de la integridad cutánea y su función barrera^{3,4}.

- Óptimo dispensador⁵
- Envase cristal topacio translúcido

Aloe Vera



Centella Asiática



Ácidos grasos
Esenciales



Extractos vegetales

Acción emoliente, humectante, tonificante y calmante.

Esencia de romero

Aroma natural y agradable, de baja persistencia. Sin perfume.

- Dispensador regulable
- Envase airless

Aloe Vera



Centella Asiática



Ginkgo Biloba




*No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes

Beneficios de la gama Linovera®:



Linovera® contribuye a un mejor mantenimiento del estado de la piel intacta cuya integridad está en riesgo:



Instrucciones de uso

1.


Limpiar gentilmente la piel en riesgo o la piel perilesional.
2.

Aplicar el producto y extenderlo suavemente sobre la piel, en lugar de frotarla.
Intente seguir la dirección de crecimiento del vello.
3.

El producto debe aplicarse 2 o 3 veces al día según lo indicado por el profesional sanitario.

Apósitos protectores

En caso necesario, proteger las zonas de riesgo con apósitos adecuados a cada localización.



Fácil de usar y aplicar en grandes superficies ^{5,9}

* Linovera debe ser empleado en piel intacta.

Utilizar junto con el resto de cuidados rutinarios.



Adecuada higiene



Cambios de posición



Adecuada nutrición



LINOVERA® SOLUCIÓN

Producto	Cód. Braun	Cantidad
Linovera® Solución 30 ml	467936	20



LINOVERA® EMULSIÓN

Producto	Cód. Braun	Cantidad
Linovera® emulsión 100 ml	492977	20



Para compras y educación, visite:
www.tiendabraun.cl

Producto con registro ISP

- 1 Lin TK, Zhong L, Santiago JL. Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils. Int J Mol Sci. 2017 Dec 27;19(1):70. doi: 10.3390/ijms19010070. PMID: 29280987; PMCID: PMC5796020.
- 2 Mercola, J.; D'Adamo, C.R. Linoleic Acid: A Narrative Review of the Effects of Increased Intake in the Standard American Diet and Associations with Chronic Disease. Nutrients 2023, 15, 3129. <https://doi.org/10.3390/nu15143129>.
- 3 M. Rabionet, et al., Ceramide synthesis in the epidermis, Biochim. Biophys. Acta (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbailp.2013.08.011>.
- 4 LaniaBG, MorariJ, Almeida ARd, Silva MNd, Vieira-Damiani G, LinsKdA, César CL, VellosoLA, Maia NB, Cintra ML, Velho PENF. Topical essential fatty acid oil on wounds: Local and systemic effects. PLoSOne. 2019;14(1):e0210059
- 5 Linovera Et LinoveraEmulsion-PMS_09.AN2. Questionnaire Report: Informe de cuestionariode valoraciónde producto[Report on the product rating questionnaire]. Rubí(Barcelona), Spain: Braun Medical S.A.U. 2021. In Spanish.

- 6 Otero DP, Domínguez DV, Fernández LH, Magariño AS, González VJ, Klepzing JVG, Montesinos JVB. Preventing facial pressure ulcers in patients under non-invasive mechanical ventilation: a randomised control trial. J Wound Care. 2017;26(3):128-36.
- 7 Aloweni F, Lim M, Chua T, Tan S, Lian S, Ang S. A randomised controlled trial to evaluate the incremental effectiveness of a prophylactic dressing and fatty acids oil in the prevention of pressure injuries. Wound Practice & Research: Journal of the Australian Wound Management Association. 2017;25(1):24-34.
- 8 Castillo Martín B, Castillo Martín JI, Lago Oliver J, Diz Gómez J. The effect of hyperoxygenated fatty acids in preventing skin lesions caused by surgical pneumatic tourniquets. Adv Skin Wound Care. 2018;31(5):214-7.
- 9 Federici A, Federici G. Evaluation of the efficacy of a preparation containing essential fatty acids and plant extracts in the prevention and treatment of dehydrated skin in diabetic patients. Acta Vulnologica. 2014;12(4):177-86.
- * Inicio fabricación 09/2024