

# PACIENTE DIABÉTICO



**25%** de las personas diabéticas **desarrollarán una UPD** a lo largo de su vida <sup>(1)</sup>

Aproximadamente el **60%** de las **UPD** presentan **infección** en estadios precoces <sup>(2)</sup>



**20%** de los pacientes diabéticos con UPD activa está preocupado por la **amputación** <sup>(3)</sup>

**85%** de las amputaciones **podrían ser evitadas** si se implementará una estrategia integral de cuidados <sup>(4)</sup>



## ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA PACIENTES DIABÉTICOS (6, 7, 8)

### DIARIO



HIGIENE DIARIA



HIDRATACIÓN



CONTROL METABÓLICO



MANTENER DIETA ADECUADA

### MENSUALMENTE

#### PRUEBA DE SENSIBILIDAD




DOPPLER<sup>(5)</sup>



DIAPAZÓN

- Puntos mostrados para identificar el 90% de pacientes con anomalía de monofilamento
- Cuarto sitio opcional
- Otros sitios recomendados



MONOFILAMENTO

1. Singh N, Armstrong DA, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. *JAMA*. 2005;293:217-28
2. K Markakis, F. L. Bowling, A. J. M. Boulton. The diabetic foot in 2015: an overview. *Diabetes Metab Res Rev* 2016; 32(Suppl. 1): 169-178. DOI: 10.1002/dmrr.2740
3. HAS. Seances de prevention des lésions des pieds chez le patient diabétique, par le pedicure-podologue. Juillet 2007. [https://www.has-santé.fr/partail/jcms/c\\_2860578/fr/evaluation-des-actes-realises-par-le-pedicure-podologue-pour-la-prevention-des-lesions-des-pieds-a-risque-de-grade-1-chez-le-patient-diabetique-actualisation-de-l-evaluation-conduite-en-2007](https://www.has-santé.fr/partail/jcms/c_2860578/fr/evaluation-des-actes-realises-par-le-pedicure-podologue-pour-la-prevention-des-lesions-des-pieds-a-risque-de-grade-1-chez-le-patient-diabetique-actualisation-de-l-evaluation-conduite-en-2007)
4. Pecoraro RE, Reiber GE, Burgess EM. Pathways to diabetic limb amputation. Basis for prevention. *Diabetes Care* 1990; 13(5):513-21
5. Wagner, FW. *Foot Ankle*, 2: 64-122, 1981